# الادوات الصوانية في جرف العجلة تقرير اولي

بقلم: بروس شرودر

تعريب وتلخيص: خالد أسعد

هدف هذه الدراسة تقديم موجز عن الاعمال التي قام بها الكاتب وعن اعمال الدكتور كون للبقايا والادوات الصوانية المكتشفة في جرف العجلة .

#### موقع الكهف:

يقع جرف العجلة في شمال الصحراء السورية على بعد ( ١٢ – ٢٢ ) كم شمال غرب مدينة تدمر ، وتشير هذه التسمية الى منخفض عريض على السفح الجنوبي لجبل المقيطيعه على بعد كيلو متر واحد الى الغرب من وادي الابيض • ويدعى الكهف ايضاً (مغارة التين) نسبة الى شجيرات من التين تنمو عند مدخله ، وسوف نطلق اسم ( جرف العجلة ) على هذا الموقع كما ذكره الدكتور كون تسهيلا البحث •

## وصف الكهف:

تبلغ مساحة الكهف ١٤٠ وارتفاعه ٥,٥ م وامتداده ٨ م يضاف اليها امتداد ضيق عرضه (١م) بعمق ستة امتار اخرى ٠ ويعتبر موقعه مثاليا لصيادي الدور الحجري القديم من حيث اطلالته واشرافه على سهل المزرع الفسيح حيث يتيح للصياد مراقبة طريدته ومطاردتها بسهولة ٠

#### البيئة:

توصف المنطقة المحيطة بتدمر بأنها صحراوية ، وقد جاء وصفها في مصور منظمة الاغذية والزراعة ( ١٩٦٣ ) بأنها منطقة شبه صحراوية ذات فصل جاف طويل ، ويلاحظ ازدياد طول الفصل الماطر كلما اتجهنا الى الشمال الغربي من تدمر ،

#### الحفريات:

اجرى الدكتور كارلتون كون تنقيبات دامت من الجرى الدكتور كارلتون كون تنقيبات دامت من ١٩٥٥/٣/٢٤ الى ١٩٥٥/٤/١٥ وقد حفر عدة اسبار الظل عليها الاحرف التالية : (A.B.C.) (انظر المخطط) (١) .

وقد بدأ بحفر اكبرها (A) الذي تبلغ ابعاده  $7 \times 10^{\circ}$  م • ثم السبر (B) في صدر الكهف ، ثم السبر (C) الذي يناظر السبر (A) من الغرب وتبلغ ابعاده  $7 \times 7,0$  م •

تتابع الطبقات في السبر (A) وعددها ٦ طبقات مميزة بألوانها وهناك طبقة سابعة سماها الدكتور كون

<sup>(</sup>١) راجع الهوامش والشروح والمخطط في المقال الاجنبي ( المعرب ) .

( بني رقم ٢) تماثلها تماماً طبقات السبر (C) عدا الطبقة الدنيا المفقودة نظراً لتداعي السفح الغربي فوقها •

كشف التنقيب عن ستة عشر سوية ، وقد صنفت حسب تبيانها الجيولوجي وتضم حسب توزعها اللوني في السبرين A و C من ادنى عمق لها التقسيمات التالية:

السبر C	السبر A	الطبقات
-	٠٤ سم	اسود
pm 12+	pm 14.	بني ١
pm 77.	٥٣٢ سم	اصفر ۱
pm 270	۳۸۰ سم	بني ١
pm 84.	٠٠٤ سم	ابيض
-	۱۱۰ سم	اصفر ۲

تبلغ مجموع الادوات الصوانية ٢٧٨٥٠ قطعة منها ٢٩٢٤ محفوظة في متحف تدمر و ١٥٠ منها معروض في متحف دمشق • وقد قمت بدراسة هذه الاسبار A و C في خريف ١٩٦٥ ، وللتأكد من صحة المعلومات قمت بحفر سبر عمودي في الكهف ابعاده (١ م) زودنا بعينات تساعد على دراسة طبقات المنطقة •

#### النتائج:

اظهرت دراسة الدكتور كون لهذا الموقع وجود ثلاثة انواع من الادوات المصنعة :

فؤوس في الطبقة الدنيا • واخرى ليفلوازية ذات صفات موستيرية في معظم الطبقات • وادوات تعود للدور الحجري القديم في الطبقة العليا • وهكذا فهي تماثل الترتيب الطبقي في وادى المغارة ووادي سكفتا • هناك عدة عوامل تجعل لهذا الموقع اهمية لدراسة الدور الحجري القديم:

١ ــ موقعه في شمال الصحراء السورية .
٢ ــ كونه ثاني موقع ينقب في سورية .

بالاضافة الى ان المعلومات التي يعطيها تساعد كثيرا في التغلب على المشاكل التي تطرحها دراسة هذا الدور ، ومنها ما قيل عن ادوات الطبقة ( بني ٢) وهي انها تمثل مرحلة تحول من حضارة الصوال الخشن الى الصوان المشطوف (كون ١٩٦٦ ، صفحة ٣٠٤) . لقد صنف الدكتور كون الادوات حسب توضعها الجيولوجي • وسنعرض تتائجها في السبر (A) بدءا بالطبقة الدنيا: وجدت ثماني فؤوس في الطبقة (اصفر ٢) ثلاثة منها صغيرة • وحوت الطبقات الاخرى نسبا متنوعة من الامواس والمكاشط والمخارز • وقد ضمت الطبقة ( بني ١ ) أدوات تعود للدور الحجري القديم منها مكأشط ومخارز . وكتعليل لوجود اسلوبين متباينين في صنع هذه الادوات في الطبقة ذاتها • حــدا بالدكتور كون ان يقول: أن صناعة الدور الحجري الأعلى قد استمر استعمالها حتى أوائل الدور الحجري الوسيط .

وقبل عرض نتائج دراسة المؤلف نذكر بعض الصعاب التي يواجهها المرء في دراسة هذه الادوات:

١ ــ اقتصار البحث على دراسة التوزع الطبقي.
الذي لا تشمل معطياته نماذج الحياة •

٢ \_\_ اقتصار الدراسة على مجموعات ناقصة من
كل طبقة ٠

وللتغلب على الصعوبات أجرينا بعض التنقيبات الأخرى ، ومع ذلك فاندراستنا ستعتمد على التصنيف الطبقي الذي وضعه الدكتور كون ، كما سنعتمد في الطبقي الذي والطبقية على ابحاث كل من الدراسة الفنية والطبقية على ابحاث كل من الدراسة الفنية والطبقية على ابحاث كل من الوسيط الدراسة الفنية والطبقية على الحجري الوسيط

( ۱۹۶۱ ) و Mme Sonnville - Bordes في دراستهم للدور الحجري القديم الاعلى ( ۱۹۵٤ ، ۱۹۵۵ ، ۱۹۵۵ ) •

والتعليقات التالية حول دراسة الادوات الموجودة في السبر (A) وهي دراسة أولية رأينا نشرها في الكتاب السنوي نظراً لفائدتها العملية المعتمدة على تحليل السيد كون ، وتشمل الدراسة ٢٩٨٥ قطعة وجدت في السبر (A):

اصفر رقم ۲ : ۱۵۲ قطعة تضم (۱۱۳ اداة) ٠

١ \_ فنيا: تغلب نسبة انتاج الصوان الخشن الليفالوازي ونسبة التوجيه فيها ٧٠/ ٠

٢ ــ نوعياً: معظمها من المثاقب والمخارز والأوجه
السننة •

٣ \_ وهناك ٧ أدوات منها أربعة مكاشط وفأس واحــدة ٠

أبيض: ٢١ قطعة (٥٣ اداة) ٠

ملاحظة: اخذت النسبة المئوية للتصنيف من مجموع ادوات رغم وجود ١٠٠٠ منها وهو ما يدعى حد ( Bordes الأدنى) ٠

١ – فنيا : يغلب الأسلوب الليفالوازي على انتاج الصوان الخشن •

۲ – تبلغ نسبة المسكاشط ۲۰٫۷٪ والمخارز ٥٫۷٪ ويبقى النوع الليفالوازي هو الغالب وهناك بعض المخارز الموستيرية (۲٫۰٪) قطع متنوعة (۲٫۰٪) قطع مستنة (۲٫۰٪) مخارز (۲٫۰٪) مخارز (۲٫۰٪) سكاكين (۲٫۰٪) والقطع الاخرى تمثل أقل من (۲٪) من المجموع ٠

بني رقم ٢ : ٢٦١ قطعة ( ٧١ اداة ) ٠

إ ـ يغلب عليها الاسلوب الليفالوازي ، وتتساوى الأدوات الصوانية الخشنة مع السكاكين .

٢ ــ تبقى السكاكين والمكاشط الليفالوازية هي الغالبة ، ويرتفع عدد المخارز الى ( ٧,٥٠/ ) وكذلك عدد المسننات ( ٧,٨/ ) ٠

### أصفر ١: ٢٩٤ قطعة (٢١٦ اداة) ٠

۱ \_ يبدأ اضمحلال النموذج الليفالوازي رغم انتشاره بنسبة عالية ، وتتساوى نسبة الصوان الخشن مع المكشوط ، وتبلغ نسبة التوجيه ٦٧٪ •

٢ ــ تكثر المكاشط فتبلغ نسبتها ١٩,٣ ونفل المخارز الى ٣,٤٪ ويضاف اليها مجموعة من السكاكين والرؤوس المدببة والمسننة ٠

### بني ١ : ١٧٥٧ قطعة ( ١٢٠١ اداة ) ٠

١ \_ يستمر ااضمحلال الاسلوب الليف الوازي حتى تقارب نسبة ٣٠٠٣/ في أعلى سوية ٠

٢ ــ تقل المكاشط والرؤوس المدببة ذات الأثر الليفالوازي وتبلغ نسبتها ٨٠٠٪ و ٤٠٠٪ على التوالي في السوية العليا • بينما تزداد نسبة المخارز الى ٢٠٠٨٪ وتلفت النظر نسبة السكاكين ، وتبلغ النسبة ٨٠٥٪ في السوية العليا من مجموع الادوات في بقية السويات •

الخلاصة: سنعرض بالتفصيل الأنواع الثلاثة لاساليب الصنع الموجودة في جرف العجلة بدلاً من محاولة استخلاص نتائج قد تكون سابقة لأوانها:

١ \_ الأدوات الحادة الموجودة في ادنى الطبقات ( اصفر ٢ ) •

من الادوات الحادة السبعة المفحوصة نجد اربعة مكاشط كما يقول ( Bordes ) ١٩٦١ ص ٣٠ ( اللوحة ١ رقم ١) وهي ذات طرف حاد وآخر مثلوم، ان وجود قطع ذات وجوه حادة واخرى غير حادة معروف في منطقة الشرق الاوسط بالرغم من ندرته ٠

٢ ـ ادوات ليفالوازية من صوانموستيري وجدت في مختلف الطبقات ، ان اقتصار البحث على عينات غير تامة من كل طبقة يجعل النسبة المئوية للأدوات الليفالوازية تزيد عما هي عليه في الحالات الطبيعية ، ورغم ذلك فليس هناك شك من استخدام الاساليب الليفالوازية حتى قمة السوية (بني ٢) ، والتباين ناتج عن تنوع بسيط في النسبة المئوية لبعض النماذج ، وتبقى نسبة السكاكين الليفالوازية الحادة وغير الحادة وبعمدل ١ الى ١ حتى أعلى الطبقة (بني ١) ،

تزيد نسبة المخارز في (بني ٢) عنها في باقي الطبقات ما عدا (بني ١) • وتقل نسبة الادوات الليفالوازية بدءاً من (بني ١) حتى ٣٠٪ • وفي الطبقة ذاتها تقل نسبة ادوات الدور الحجري القديم كالمكاشط والمخارز •

٣ \_ صناعة الدور الحجري القديم بدءا من الطبقة ( بني ١ ):

أول ما يلفت النظر ظهور نماذج من ادوات الدور الحجري القديم في أدنى مستويات هذه الطبقة وكذلك السكاكين المحدبة المعروفة بالسكاكين ذات الرأس الصغير نسبة لمقدمتها ويبدأ ظهور هذا النوع في الطبقة (اصفر ۱) حتى (بني ۱) ويلاحظ كثرة المكاشط في هذه السويات و

لا يمكننا الآن الاجابة على التساؤل عما يعينه وجود مختلف أنواع الادوات في الطبقة العليا من جرف العجلة ، وان امكانية وجود صناعة مرحلية كما هو معروف في : ملالاله Ksâr' AKIL سيبحث فيما بعد ، وهذا على أية حالة يتطلب دراسة أدق لطبقات الموقع وتحليل علمي تقني للادوات المكتشفة ،

وأخيرا اشكر جميع الذين ساعدوني في دراستي، وبشكل خاص المديرية العامة للآثار والمتاحف وموظفيها في تدمر •